Fiche Technique
Artaban

Origine

Parents : Mtp 3082-1-42xRegent
Année d'obtention : 2018
Obtenteur : INRAe, Montpellier *(France)*
Hybrideur : A. Bouquet
Surface plantée : 12 ha en France *(2019)*

©Grouoe ICV

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++++	REN3-RUN1
Mildiou	+++	RPV1-RPV3
Black-rot	-	Non testé

Résistance totale à l'oïdium, légers dégâts de mildiou sur feuille (nécrose non fructifiées) et sensible au black-rot.

- **Débourrement** : Comme pour le Merlot
- **Maturité** : Moyenne à tardive *(après le Merlot)*

- **Rendement** : 9-11 t/ha
- Vigueur moyenne
- Port dressé
- Sensible à une carence magnésienne sur jeune vigne
- Rameaux semi dressés, palissage nécessaire

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Taille des baies : moyenne
- Couleur ne sort pas vite

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- PH acide : peu de malique et beaucoup de tartrique.
- Potentiel couleur moyen, sensibilité au jaunissement.
- Tanins agressifs sur faibles maturités.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Artaban

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
3 vins dégustés sur 2 millésimes (2018 à 2019).



Caractère fruit rouge et dans une moindre mesure confiture seulement pour maturités >13%. Agressivité des tanins et importance de l'acidité pour maturités <13%.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
1 vin dégusté sur 1 millésime (2019).



Nez peu intense : plutôt fruité blancs/sirop et cassis malgré faible maturité (11%). En bouche : domination de l'acidité et de la présence tannique.

Fiche Technique
Artaban

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique Cabernet Cortis®

Origine

Parents : Cabernet Sauvignon x Solaris®
Année d'obtention : 1982
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut Freiburg *(Allemagne)*
Hybrideur : Dr. Nobert Becker
Surface plantée : 22 ha en France *(2019)*

©Grouoe ICV

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++	REN3.2
Mildiou	++	RV10
Black-rot	++	Non testé

Attaques marquées d'oïdium en absence de traitement en région méditerranéenne. 2 à 3 traitements nécessaires.
Quelques tâches de mildiou avec sporulation en cas de forte attaque

- **Débourrement** : Précoce *(6 jours avant Merlot)*
- **Maturité** : Très précoce *(2 semaines avant Merlot)*

- **Rendement** : 9-11 t/ha
- Vigueur forte
- Port semi-dressé
- Palissage nécessaire
- Adaptation à la taille mécanique

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Taille des baies : moyenne
- Grappes assez lâches

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- pH acide.
- Un potentiel couleur faible avec tendance au jaunissement.
- Profils aromatiques fruités, s'exprime bien en rosé.
- Tanins potentiellement agressifs.
- Résistance oïdium moyenne.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Cabernet Cortis®

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
4 vins dégustés sur 4 millésimes (2015 à 2018).



Nez complexe : fruits rouges, confiture. Attention à l'herbacé qui peut être important. En bouche, les tanins très présents confèrent toujours un peu de sècheresse et d'amertume.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
5 vins dégustés sur 4 millésime (2015 à 2019).



Peut produire des vins caractérisés par des notes aromatiques de buis, de fruits exotiques et d'agrume. Le manque de maturité peut induire un caractère soufré. L'acidité est toujours élevée, même pour les forts volumes. Peut développer de la sècheresse et de l'amertume.

Fiche Technique
Cabernet Cortis®

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique Monarch

Origine

Parents : Solaris x Dornfelder
Année d'obtention : 1988
Obtenteur : Staaliches Weinbauinstitut Freiburg *(Allemagne)*
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 11 ha *(2019)*

©Grouoe ICV

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++ / +	REN 3.2
Mildiou	++	RV 10
Black-rot	++	Non Testé

Assez sensible à l'oïdium (10 % sur grappes en région méditerranéenne sans traitement).
Deux traitements obligatoires sont nécessaires.
Sensible au mildiou en cas de très forte pression.

- **Débourrement** : Précoce à moyen
- **Maturité** : Moyenne *(comme le Merlot)*

- **Rendement** : 10-14 t/ha
- Vigueur forte
- Port retombant
- Palissage indispensable
- Sensible au dessèchement de la rafle

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Grappes assez lâches
- Taille des baies : moyenne
- Couleur sort vite

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Palissage nécessaire.
- Traitements oïdium nécessaires en région méditerranéenne.
- pH bas : fort potentiel acide
- Fort potentiel couleur, avec extraction rapide.
- Peut faire des rosés mais la couleur sort vite à tendance jaune.
- Expression aromatique peu intense sur faibles maturités.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Monarch

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 millésimes (2017 à 2019).



Profil olfactif peu intense et peu complexe : les notes fruits rouges apparaissent au-delà de 13 %.
En bouche, l'équilibre est dominé par une acidité très élevée et une intensité tannique forte.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
2 vins dégustés sur 1 millésime (2019).



Le profil olfactif est peu intense et peu complexe. Peu d'originalité aromatique. L'acidité domine l'équilibre en bouche.

Fiche Technique
Monarch

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Parcelle 1 : 2 heures de macération pelliculaire.
Parcelle 2 : Pas de macération pelliculaire.

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Muscaris B

©Groupe ICV

Origine

Parents : Solaris® x Muscat à petits grains blancs
Année d'obtention : 1987
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut Freiburg *(Allemagne)*
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 22 ha en France *(2019)*

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	-/+	REN3.2
Mildiou	++/+++	RV10
Black-rot	Non testé	Non testé

Mildiou sur feuille en cas de forte pression. Dégâts d'oïdium marqués en absence de traitement en région méditerranéenne.

- **Débourrement :** Précoce à moyen *(quelques jours après Chardonnay)*
- **Maturité** : Très précoce *(quelques jours avant le Chardonnay)*

- **Rendement** : 11 t/ha
- Vigueur forte
- Port semi érigé
- Palissage nécessaire
- Adaptation à la taille mécanique
- Très sensible au stress hybrique

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Petit grappe lâche
- Baies moyennes
- Pulpe fruitée, à tendance un peu visqueuse
- Pellicule dure, herbacées
- aptitude à la macération pelliculaire

Profil Organoleptique

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 Millésimes (2015 à 2017)



Les vins obtenus sont caractérisés par la présence de notes florales, fruits blancs que l'on trouve habituellement sur les vins de Muscat. Le volume est souvent très important et soutenu par l'acidité.

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Cépages particulièrement précoce.
- Traitement oïdium nécessaire en région méditerranéenne.
- Caractérisé par des notes muscatées.

Fiche Technique
Muscaris B

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l'iCV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique Prior®

©Grouoe ICV

Origine

Parents : FR 4-61 x FR 236-75 R
Année d'obtention : 1987
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut Freiburg *(Allemagne)*
Hybrideur : Dr. Becker Norbert
Surface plantée : 3 ha en France *(2019)*

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	+++	REN3.2
Mildiou	++	RPV3
Black-rot	++	Non Testé

Doutes sur la durabilité de la résistance au mildiou, car le gène Rpv3 a été contourné.

- **Débourrement** : tardif *(après le Merlot)*
- **Maturité** : Moyenne à tardive *(après le Merlot)*

- **Rendement** : 12-14 t/ha
- Vigueur moyenne
- Port dressé

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Grappes compactes
- Taille des baies : moyenne
- Couleur sort vite

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Des niveaux de malique élevés, même à maturité avancée.
- Un potentiel couleur important avec une sortie rapide.
- Des profils aromatiques plus intéressants en rouge qu'en rosé.
- Un fort potentiel polyphénols et des tanins à travailler.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Prior®

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 millésimes (2017 à 2019).



Les notes de fruit rouge sont régulièrement dominantes sur les profils olfactifs. L'acidité est souvent importante. Une attention particulière devra être portée au travail des tanins pour éviter la sècheresse.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
1 vin dégusté sur 1 millésime (2019).



Le profil olfactif est peu intense et peu complexe. Peu d'originalité aromatique. L'acidité et le volume s'équilibrent bien.

Fiche Technique
Prior®

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Soreli®

Origine

Parents : Tokay friulano x Kozma 20-3 (UD 34 113)
Année d'obtention : 2002
Obtenteur : Instituto di Genomica Applicata d'Udine *(Italie)*
Hybrideur :
Surface plantée : 48 ha en France *(2019)*

©OsCar

- **Débourrement :** Moyen
- **Maturité** : Précoce *(comme le Chardonnay)*

- **Rendement** : 9-11 t/ha
- Vigueur moyenne à élevée
- Port semi retombant
- Palissage nécessaire
- Grappe peu compacte

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	+	REN3
Mildiou	++	RPV12-RPV3
Black-rot	-	Très sensible

Un à 3 traitements contre l'oïdium nécessaires.

Eléments Analytiques



Caractéristique des baies

- Baies jaune paille à maturité
- Pulpe fruitée, assez juteuse, avec bon équilibre sucré/acide
- Pellicule épaisse, restant ferme, avec persistance de notes herbacées

Profil Organoleptique

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'agriculture 34
4 vins dégustés sur 2 Millésimes (2017 à 2018)



Selon le millésime et la parcelle, les vins obtenus sont caractérisés par la présence de notes soufrées, d'agrumes et de fruits exotiques. Si la maturité est plus poussée, des notes de buis et de sécheresse peuvent apparaître. L'acidité, le volume et l'amertume sont eux par contre régulièrement importants.

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Résistance moyenne à l'oïdium et sensibilité élevée au black rot
- Bonne aptitude à la taille mécanique
- Produit des vins fruités et agréables, avec une bonne fraîcheur

Fiche Technique
Soreli®

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l'iCV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Souvignier Gris

©Groupe ICV

Origine

Parents : Cabernet-Sauvignon x Bronner
Année d'obtention : 1983
Obtenteur : Staaliches Weinbauinstitut Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 144 ha en France *(2019)*

- **Débourrement :** Moyen *(5 j après le Chardonnay)*
- **Maturité** : Moyenne *(10 j après le Chardonnay)*

- **Rendement** : 11-14 t/ha
- Vigueur forte
- Port érigé
- Adaptation à la taille mécanique
- Nombreux grapillons
- Grappe peu compacte

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++++	REN 3.2
Mildiou	+++	Non testé
Black-rot	+++	Non testé

Bonne résistance oïdium, mais risque de développement dans le temps sans traitement dans un contexte de forte pression.
Mildiou : quelques dégâts sans sporulation en cas de forte pression.

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Baies gris/rose très foncé - pas d'extraction de couleur en macération
- Pulpe très ferme
- Pellicule épaisse
- Bonne aptitude à la macération pelliculaire

Profil Organoleptique

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'agriculture 34
7 vins dégustés sur 5 Millésimes (2015 à 2019)



Selon le millésime et la parcelle l'expression aromatique de ce cépage est variable : obtention de notes fruitées agrumes, fruits exotiques et dans une moindre mesure, fruits blancs. Des notes fortes de buis ou de soufré végétal ont pu être parfois relevées. L'acidité et le volume sont par contre régulièrement importants.

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Bonne résistance au mildiou, à l'oïdium et au black-rot.
- Productif et adapté à la mécanisation.
- Niveau d'acidité élevé.
- Adapté à la production de vins typés fruits exotiques, agrumes MAIS peut aussi produire des notes soufrées.

Fiche Technique
Souvignier Gris

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :
Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l'iCV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique Vidoc

©Oscar

Origine

Parents : Mtp 3082-1-42 x Regent
Année d'obtention : 2018
Obtenteur : INRA, Montpellier *(France)*
Hybrideur : A. Bouquet

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++++	REN3-RUN1
Mildiou	+++	RPV1-RPV3
Black-rot	+	Non Testé

Résistance totale oïdium, légers dégâts de mildiou sur feuille (nécroses non fructifiées)

- **Débourrement** : Comparable au Grenache *(quelques jours après le Merlot)*
- **Maturité** : Assez tardive *(7 jours après le Merlot)*

- **Rendement** : 10-12 t/ha
- Vigueur bonne
- Port semi-dressé
- Palissage nécessaire
- Fertilité bonne

Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- Grappes compactes
- Taille des baies : petite
- Couleur sort rapidement

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Des pH très élevés, même à maturité moyenne.
- Fort potentiel couleur, avec extraction rapide.
- Peut faire des rosés mais la couleur sort vite à tendance jaune, en lien avec des pH élevés.
- Aussi bien adapté à la vinification des rouges que des rosés.
- Aucune originalité aromatique à signaler.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Vidoc

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
3 vins dégustés sur 1 millésime (2019).



Travaillé à des maturités de ~13,5%, ce cépage peut présenter des tanins agressifs qu'il faudra travailler. Les profils olfactifs montrent des notes végétales qu'une maturité plus poussée pourrait gommer.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
2 vins dégustés sur 1 millésime (2019).



L'équilibre en bouche est dominé par le volume. Peu d'originalité aromatique, les profils olfactifs peuvent être marqués par des notes végétales ou amyliques.

Fiche Technique
Vidoc

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :

Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr